

DƯỢC LÂM SÀNG

HƯỚNG DẪN

VIẾT BÀI THU HOẠCH

Trình bày: BS. Nguyễn Văn Thịnh

YÊU CẦU

1. Vấn đề chọn thuốc:

- Lý do chọn:

▪ **Thuốc**

▪ **Biệt dược**

- Chọn thuốc có phù hợp:

▪ **Cơ địa người bệnh**

▪ **Tình trạng bệnh**

- **Phối hợp – Tương tác**

YÊU CẦU

2. Vấn đề sử dụng thuốc:

- Cách sử dụng:

- **Liều lượng**
- **Dạng sử dụng**
- **Thời gian sử dụng**

- Theo dõi sử dụng thuốc:

- **Biểu hiện khác thường**
- **Nguy cơ tai biến**

YÊU CẦU

3. Vấn đề thay đổi thuốc:

- Tại sao thay đổi:
 - Thuốc, biệt dược
 - Dạng thuốc
 - Cách dùng
- Tính hợp lý.
- Hiệu quả thay đổi thuốc thế nào.

THANG ĐIỂM

THANG ĐIỂM THU HOẠCH DƯỢC LÂM SÀNG

Nội dung	Yêu cầu	Điểm
Vấn đề chọn thuốc	Lý do chọn: thuốc, biệt dược	2
	Phù hợp cơ địa, tổng trạng	1
	Tương tác thuốc	1
Vấn đề sử dụng thuốc	Cách sử dụng: liều, dạng, thời gian	1
	Theo dõi: biểu hiện, tai biến	1
Vấn đề thay đổi thuốc	Lý do thay đổi thuốc, biệt dược, cách dùng	2
	Thay đổi có hợp lý	1
	Hiệu quả thay đổi	1

LƯU Ý

- Phân tích tất cả những thuốc có trong tình huống.
- Phân tích theo chiều dọc
- Bám sát thực tế
- Đưa ra giả thuyết, suy luận

TÓM TẮT BỆNH ÁN

1. Tóm tắt hành chánh:

- BN: Ngô Cao Cường, 37 tuổi,
- Nghề nghiệp: viên chức
- Nhập viện ngày 17/5/2010.
- Lý do nhận viện: Sốt + Tiêu chảy hơn 1 tuần
- Tình trạng lúc vào viện: sốt cao, tiêu chảy, HA: 150/90mmHg
- Chẩn đoán: Thường hàn/ Cao huyết áp

2. Tóm tắt quá trình điều trị:

- Ngày 17/5/2010: sốt, đau bụng, tiêu chảy. Thuốc dùng:
 - Ringer Lactat 500ml: XXX g/phút.
 - Nifedipin 10mg: 1v x 2 (uống)
 - Ciprofloxacin 500mg: 1v x 3 (uống).
 - Efferalgan 500mg: 1v x 3 (uống).
 - Spasmaverin 40mg: 1v x 3 (uống).

- Ngày 18/5/2010: bớt đau bụng, còn sốt và tiêu chảy và nhúc đầu:
 - Thay Ciprofloxacin bằng Ofloxacin 200mg: 1v x 2(u)
 - Ngưng Ringer Lactat.
 - Thêm Antibio: 1g x 3 (uống).
- Ngày 19/5/2010: bớt sốt và tiêu chảy nhưng vẫn còn nhúc đầu:
 - Thêm Amlodipin 5mg: 1g x 2 (uống).
 - Thêm Seduxen 5mg: 1v (uống tối)
- Ngày 20/5/2010: vẫn còn nhúc đầu, đi cầu khó
 - Thay Amlodipin bằng Captopril 25mg: 1v uống tối.
 - Thêm Rectiofar: 1 ống bơm trực tràng.
 - Ngưng Spasmaverin.
- Ngày 21/5/2010: bớt nhúc đầu, ngủ được nhưng vẫn chưa đi cầu được
 - Thêm Sorbitol: 1g x 3 (uống).
 - Ngưng Seduxen và Efferalgan.

BỐC THĂM CHỌN ĐỀ

- **Số báo danh chia 3:**
 - **Chia hết: số mã hoá = 3**
 - **Dư 1: số mã hoá = 1**
 - **Dư 2: số mã hoá = 2**
- **3 đại diện số mã hoá bốc thăm chọn đề A,B,C**
- **Số mã hoá làm theo đề tương ứng**